


Стандартная циторедуктивная терапия у пациентки с первичным миелофиброзом низкого риска

Image



Стандартная циторедуктивная терапия у пациентки с первичным миелофиброзом низкого риска

Эксперт – Суборцева Ирина Николаевна, старший научный сотрудник отделения стандартизации методов лечения ФГБУ НМИЦ гематологии МЗ РФ, к.м.н.

В данном видео эксперт разбирает возможности лечебной тактики пациентки с потерей ответа на первую линию терапии миелофиброза.

Эксперт подчеркивает, что для подтверждения диагноза требуется* наличие соответствующей гистологической картины и молекулярно-генетическое исследование с обнаружением мутаций в генах JAK2, CALR, MPL.

Определение прогноза пациентов с ПМФ базируется на оценке клинических и лабораторных характеристик, наличии неблагоприятных хромосомных aberrаций и потребности в гемозаместительной терапии.

Ключевым моментом для определения лечебной тактики при ПМФ является определение прогноза на каждом визите.

* согласно классификации ВОЗ (2017)
ПМФ – первичный миелофиброз

714551/JAK/video/10.23/0

Теги

- Гематология
-

Source URL:

<https://www.pro.novartis.ru/therapeutical-areas/hematology/myeloproliferative-diseases/biblioteka-klinicheskikh-sluchaev/standard-cytoreductive-therapy>