

Режим дозирования элтромбопага

Image



Режим дозирования элтромбопага

Режим дозирования при ТАА¹

1-я линия терапия

Элтромбопаг следует применять одновременно со стандартной ИСТ. Нельзя превышать первоначальную дозу.

Image

Взрослые и подростки (в возрасте от 12 лет и старше)	Дети (в возрасте от 6 до 11 лет)	Дети (в возрасте от 3 до 5 лет)
150 мг раз в сутки	75 мг раз в сутки	2,5 мг/кг раз в сутки

Рефрактерная ТАА¹

- Начальная доза элтромбопага составляет **50 мг 1 раз в сутки**.
- Для достижения гематологического ответа требуется увеличение дозы, как правило, **до 150 мг**.
- Дозу элтромбопага следует увеличивать **с шагом 50 мг каждые 2 недели** до дозы, необходимой для достижения целевого количества тромбоцитов $\geq 50\ 000/\text{мкл}$.
- У пациентов, принимающих препарат в дозе 25 мг 1 раз в сутки, следует увеличить суточную дозу до 50 мг перед дальнейшим повышением дозы на 50 мг.
- **Не следует превышать дозу 150 мг в сутки.**

Примечание.

* Информация о коррекции дозы у пациентов азиатского происхождения (китайцы, японцы, корейцы, тайцы, жители Тайваня) находится в полной инструкции по медицинскому применению препарата элтромбопаг.

Коррекция терапии

1-я линия терапия¹

Image

Количество тромбоцитов	Коррекция дозы или ответ
> 200 000/ мкл — ≤ 400 000/ мкл	Снижать суточную дозу на 25 мг каждые 2 недели до минимально возможной дозы, при которой количество тромбоцитов ≥ 50 000/мкл. У детей в возрасте 3–12 лет, принимавших элтромбопаг в дозе 25 мг 1 раз в сутки, следует рассмотреть возможность приема препарата в дозе 25 мг через день
> 400 000/мкл	Прекратить прием элтромбопага на 1 неделю. При количестве тромбоцитов < 200 000/мкл возобновить прием элтромбопага в дозе, сниженной на 25 мг (у детей в возрасте 3–12 лет, принимавших элтромбопаг в дозе 25 мг 1 раз в сутки, следует рассмотреть возможность приема препарата в дозе 25 мг через день)

Рефрактерная ТАА¹

Image

Количество тромбоцитов	Коррекция дозы или ответ
<p>< 50 000/мкл в течение по крайней мере 2 недель терапии</p>	<p>Повысить суточную дозу на 50 мг, но не выше 150 мг в сутки. У пациентов азиатской расы или пациентов с нарушением функции печени, принимающих препарат в дозе 25 мг 1 раз в сутки, следует увеличить суточную дозу до 50 мг перед дальнейшим повышением дозы на 50 мг</p>
<p>≥ 200 000/мкл – ≤ 400 000/мкл в любое время</p>	<p>Снизить суточную дозу на 50 мг. Спустя 2 недели оценить эффект от коррекции дозы и принять решение о дальнейшей коррекции дозы</p>
<p>> 400 000/мкл</p>	<p>Прекратить прием элтромбопага не менее чем на 1 неделю. При количестве тромбоцитов ≤ 150 000/мкл возобновить лечение в суточной дозе, сниженной на 50 мг</p>
<p>> 400 000/мкл после 2 недель терапии в наименьшей дозе</p>	<p>Прекратить прием элтромбопага</p>

Список литературы

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Элтромбопаг ЛСР-010032/09 на 03.11.2020.

11213651/REV/WEB/10.24/0

Теги

- Гематология
-

Source URL:

<https://www.pro.novartis.ru/therapeutical-areas/hematology/rezhim-dozirovaniya-eltrombopaga>