



## Клинический разбор №5

В рамках «Полиморбидной Академии» мы опубликовали несколько клинических ситуаций, требующих особенно внимательного подхода к диагностике и терапии. Цикл разборов завершает случай\*, подготовленный при участии Ектерины Васильевны Глейкиной, заведующей кардиологическим отделением №2 ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница».

В фокусе внимания пациент с ХСН IIA и поражением почек, госпитализированный в связи с признаками острой сердечной недостаточности. В анамнезе:

- Инфекционный эндокардит с поражением митрального клапана, митральная недостаточность 2 ст.;
- Повышение АД до 190/100 мм рт.ст. с исключительно симптоматической терапией в течение нескольких лет;
- Стенокардия на II ФК в течение нескольких лет;
- По шкале CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc — 9 баллов.

Пациенту назначено лечение, однако менее чем через год потребовалась повторная госпитализация в связи с ОДСН. Какие коррективы необходимы, чтобы стабилизировать ситуацию? Давайте разберемся вместе.

\* — гипотетический клинический случай

11275290/SAC-VAL\_INC/DIG/04.26/0

### Теги

- Кардиология

### Source URL:

<https://www.pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutical-areas/cardiology/hsn/clinical-case-5>